

# **Aus aktuellem Anlass: Deutsche Hochwasser- und Niederschlagschronologien**

geschrieben von Wolfgang Müller | 4. Juni 2013

Unser Beitrag untersucht die Klimavariablen Abfluß und Niederschlag und das Potential, das Hochwasserrisiko in Deutschland in den vergangenen Jahrhunderten zu quantifizieren. Wir beschränken uns dabei vornehmlich auf eigene Untersuchungen. [...]

## **Ergebnisse und Schlußfolgerungen**

**Hochwasserchronologien von Elbe und Oder über die letzten 800–1000 Jahre wurden von Mudelsee et al. (2003) konstruiert und veröffentlicht. Inhomogenität durch Dokumentenverlust ist für beide Flüsse für den Zeitraum nach 1500 vernachlässigbar. Mudelsee et al. (2003) schätzten Risikokurven extremer Elbe- und Oderhochwasser; diese dokumentieren keinen Anstieg (Sommerhochwasser) bzw. einen Abfall (Winter) für das 20. Jahrhundert. Ursache des Abwärtstrends im Winter ist wahrscheinlich das seltenere Auftreten von starken Eisdecken, die**

**im Frühjahr aufbrechen und hohe Wasserstände deutlich verstärken können.**

**Ursache der geringeren Flußvereisungen ist nicht erhöhte Verschmutzung, sondern regionale Erwärmung (Mudelsee et al., 2004). Die Trends für das 20. Jahrhundert sind in ungefährender Übereinstimmung mit den Trends des Risikos des Überschreitens des 25-jährigen Maximums der Niederschlagszeitreihen (Hulme et al., 1998) in den Einzugsgebieten.**

**Eine Hochwasserchronologie für die Werra (1500–2003) und entsprechende Risikoschätzungen werden von Mudelsee et al. (2006) präsentiert. Seit 1760 nimmt das Sommerhochwasserrisiko der Werra ab; das Winterhochwasserrisiko zeigt signifikante Schwankungen und einen Aufwärtstrend für das 20. Jahrhundert.**

**Der Schluß (Houghton et al., 2001),  
eine erhöhte regionale Temperatur  
bewirke „automatisch“ eine Erhöhung  
des Hochwasserrisikos  
(Clausius–Clapeyron-Gleichung), ist  
zu einfach.**

**Gefunden bei ACHGUT mit Dank an  
Finder Benny Pesier**